



Título

ESTUDO DA NEUROPATIA DIABÉTICA COMO APRENDIZADO DE ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNOPAR

Autor(es)

- 1 - ADRIANA MARIA RECH LEROUX
- 2 - DENISE POLIS BORTONI
- 3 - GEISA MARCELA PERDIGÃO
- 4 - VANDA JOSÉ DE OLIVEIRA
- 5 - CARINA FERREIRA DOS SANTOS
- 6 - ALEXANDRE ALVARENGA RIBEIRO
- 7 - LUCIANE FURLAM
- 8 - ÉRIKA BERNARDO DA SILVA
- 9 - ADRIANO PEREIRA GURGEL
- 10 - MARCIA EIKO KARINO

Descrição do(s) Autor(es)

- 1 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 2 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 3 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 4 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 5 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 6 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 7 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 8 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 9 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 10 - DOCENTE UNOPAR

Resumo

Neuropatia diabética periférica (PSN) é caracterizada por um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas, que afeta os nervos periféricos. A hiperglicemia é uma das principais causas, entretanto, outros fatores importantes, sobretudo a isquemia do nervo. Os danos causados nos nervos pela diabetes também podem conduzir problemas aos órgãos internos, como o trato digestivo, coração e órgãos sexuais. Calcula-se que 60% dos pacientes com diabetes têm alguma forma de neuropatia, mas na maioria dos casos 30 a 40%, não apresentam sintomas. O objetivo deste estudo é ampliar os nossos conhecimentos sobre neuropatia diabética, bem como das possíveis complicações que o paciente possa vir a ter, como o pé diabético, para assim atuarmos na prevenção e controle desta patologia, como de seus agravos. A metodologia utilizada foi através de reuniões científicas periódicas com acadêmicos do curso de graduação de enfermagem dos 3º e 4º anos, participantes do Projeto intitulado Identificação dos pés de risco em trabalhadores diabéticos de uma Instituição Pública da Cidade de Londrina/PR da UNOPAR. A revisão bibliográfica foi através de busca em bases de dados da internet, em livros e revistas especializadas. Concluímos que é de fundamental importância que o paciente com PSN tenha um bom controle glicêmico, bem como adote medidas preventivas como dietas, reeducação alimentar e, principalmente, a monitorização glicêmica. Sendo o pé diabético a principal consequência da PSN, é imprescindível para nós acadêmicos de enfermagem, termos embasamento científico e prático desta patologia para melhor orientação, traçar medidas preventivas e educacionais a população.